


Technológiai javaslat Napraforgó



Cél	Időszak	Adagolás Hektáronként	Alkalmazás	Hatás
Talajmicrobiom aktiválás, regenerálás	Maggyelőkészítés	Rokolan 10-20L Microbion C 1L	Maggyelőkészítéssel egy menetben, talajba forgatva	Természetes talajélet serkentése, káros mikroorganizmusok elnyomása
Hajtás, növekedés segítése	Vetés	Hymagro microgranulátum (megfelelő géppark esetén) 6-10Kg	Gyomirtó szerekkel együtt	Tápanyagok felvételének fokozása a talajból. Gyökértömeg növelés. Stresztűrés fokozása
	1. permetezés / 2-4 leveles állapotban	Hymagro-Sol 6L Csak abban az esetben szükséges ha a Hymagro microgranulátum nem lett kijuttatva vetéskor Rokohumin 2L Plantmix 1L		
Minőség javítás	2. permetezés / 6-8 leveles állapotban	Hymagro-Sol 4L Rokohumin 3L Plantmix 1L	Gombaölő és rovarölő szerekkel együtt	Termékenyülés elősegítése A gabona minőségi mutatóinak javítása
	3. permetezés / csillagbimbós állapot	Rokohumin 2L Microbion C 1L	Rovarölő szerekkel együtt	Kórokozó fertőzés hatásának csökkentése Szentelítődés elősegítése
4. permetezés / Teljes virágzás után	Rokohumin 3L	Gombaölő és rovarölő szerekkel együtt		
Tarlóbontás, talajszerkezet javítás, microbiom regenerálás	Aratás után, tarlóhántás, zöldítés előtt	Rokolan 10-20L Microbion C 1L	Tarlóhántással egy menetben	Optimális szármaradvány bontás következő kultúránévny számára a termés potenciális meglapozása