


Technológiai javaslat Kukorica



Cél	Időszak	Adagolás Hektáronként	Alkalmazás	Hatás
Talajmicrobiom aktiválás, regenerálás	Magány előkészítés	Rokolan 10-20L Microbion C 1L	Magányelőkészítéssel egy menetben, talajba forgatva	Természetes talajélet serkentése, káros mikroorganizmusok elnyomása
Hajtás, növekedés segítése	Vetés	Hymagro microgranulátum (megfelelő géppark esetén) 6-10Kg	Gyomirtó szerekkel együtt	Tápanyagok felvételének fokozása a talajból. Gyökértömeg növelés. Stresztűrő fokozása
	1. permetezés 2-4 leveles állapotban	Hymagro-Sol 6L Csak abban az esetben szükséges ha a Hymagro microgranulátum nem lett kijuttatva vetéskor Rokohumin 2L Plantmix 1 L		
	2. permetezés 6-8 leveles állapotban	Hymagro-Sol 2 L Rokohumin 3 L Plantmix 1L		
Minőség javítás	3. permetezés virágzás előtt 2 héttel	Rokohumin 2L Microbion C 1 l	Rovarölő szerekkel együtt	Kórokozó fertőzés hatásának csökkentése Szemtelítődés elősegítése
	4. permetezés Szemtelítődéskor	Rokohumin 3 L	Gombaölő és rovarölő szerekkel együtt	
Tarlóbontás, talajszerkezet javítás, microbiom regenerálás	Aratás után, tarlóhántás, zöldítés előtt	Microbion C 1L Rokolan 10-20L	Tarlóhántással egy menetben	Optimális szármaradvány bontás következő kultúrnövény számára a termés potenciális meglapozása